

VENTA BAJO RECETA
INDUSTRIA ARGENTINA

DES LORAMAR
DES LORATADINA 5 mg DES LORATADINA 5 mg /10 ml
COMPRIMIDOS RECUBIERTOS JARABE



Lea esta información detenidamente antes de empezar a tomar este medicamento, porque contiene información importante para usted.

- Conserve este prospecto, ya que puede tener que volver a leerlo.
- Si tiene alguna duda, consulte a su médico.
- Este medicamento se le ha recetado solamente a usted, y no debe dárselo a otras personas aunque tengan los mismos síntomas que usted, ya que puede perjudicarles.
- Si experimenta efectos adversos, consulte a su médico, incluso si se trata de efectos adversos que no aparecen en este prospecto.

CONTENIDO DEL PROSPECTO

1. Qué es DESLORAMAR y para qué se utiliza
2. Qué necesita saber antes de empezar a tomar DESLORAMAR
3. Cómo tomar DESLORAMAR
4. Posibles efectos adversos
5. Conservación de DESLORAMAR
6. Presentaciones de DESLORAMAR.

1. QUÉ ES DESLORAMAR Y PARA QUÉ SE UTILIZA

DESLORAMAR contiene desloratadina, que es un antihistamínico (antialérgico).

Para que se usa DESLORAMAR:

DESLORAMAR alivia los síntomas asociados con la rinitis alérgica (inflamación de las fosas nasales provocada por una alergia, por ejemplo, fiebre del heno o alergia a ácaros del polvo). Estos síntomas incluyen estornudos, rinitis, picor nasal, picor en el paladar y picor, enrojecimiento de ojos o lagrimeo. DESLORAMAR también se utiliza para aliviar los síntomas asociados con la urticaria (enfermedad de la piel caracterizada por ronchas y picazón).

2. QUÉ NECESITA SABER ANTES DE EMPEZAR A TOMAR DESLORAMAR

No tome DESLORAMAR:

- si es alérgico a desloratadina o a cualquiera de los demás componentes de este medicamento o a loratadina.

Advertencias y precauciones:

Consulte a su médico, antes de empezar a tomar DESLORAMAR si presenta la función renal alterada.

Toma de DESLORAMAR con otros medicamentos:

No hay interacciones conocidas de DESLORAMAR con otros medicamentos. Informe a su médico o farmacéutico si está tomando, ha tomado recientemente o podría tener que tomar cualquier otro medicamento.

Toma de DESLORAMAR con alimentos y bebidas:

DESLORAMAR se puede tomar con independencia de las comidas.

Embarazo, lactancia y fertilidad:

Si está embarazada o en periodo de lactancia, cree que podría estar embarazada o tiene intención de quedarse embarazada, consulte a su médico o farmacéutico antes de utilizar este medicamento.

No se recomienda que tome DESLORAMAR si está embarazada o amamantando a un bebé.

Fertilidad: No hay datos disponibles sobre la fertilidad masculina y femenina.

Conducción y uso de máquinas: A la dosis recomendada, no se espera que este medicamento afecte a su capacidad para conducir o utilizar máquinas. Aunque la mayoría de las personas no experimentan somnolencia, se recomienda no desempeñar actividades que requieran un estado de alerta mental, como conducir un coche o utilizar máquinas hasta que haya determinado su propia respuesta al medicamento.

DESLORAMAR contiene lactosa:

DESLORAMAR comprimidos contiene lactosa. Si su médico le ha indicado que padece una intolerancia a ciertos azúcares, consulte con él antes de tomar este medicamento.

3. CÓMO TOMAR DESLORAMAR

Siga exactamente las instrucciones de administración de este medicamento indicadas por su médico. En caso de duda, consulte de nuevo a su médico o farmacéutico.

Comprimidos recubiertos:

Adultos y adolescentes a partir de 12 años de edad:

La dosis recomendada es un comprimido una vez al día con agua, con o sin alimentos. Este medicamento es para usar por vía oral. Trague el comprimido entero.

Jarabe:

Utilizar la medida dosificadora provista en el envase.

Niños:

Niños de 1 a 5 años de edad: La dosis recomendada es 2,5 ml de solución oral una vez al día.

Niños de 6 a 11 años de edad: La dosis recomendada es 5 ml de solución oral una vez al día.

Adultos y adolescentes a partir de 12 años de edad:

La dosis recomendada es 10 ml de solución oral una vez al día. Este medicamento es para usar por vía oral.

Puede tomar este medicamento con o sin alimentos.

Duración del tratamiento:

Respecto a la duración del tratamiento, su médico determinará el tipo de rinitis alérgica que padece y durante cuánto tiempo debe tomar DESLORAMAR. Si su rinitis alérgica es intermitente (presencia de síntomas durante menos de 4 días a la semana o durante menos de 4 semanas), su médico le recomendará una pauta de tratamiento que dependerá de la evaluación de la historia de su enfermedad.

Si su rinitis alérgica es persistente (presencia de síntomas durante 4 o más días a la semana y durante más de 4 semanas), su médico puede recomendarle un tratamiento a largo plazo.

Para la urticaria, la duración del tratamiento puede variar de un paciente a otro y por lo tanto deberá seguir las instrucciones de su médico.

Si toma más DESLORAMAR del que debe:

Tome DESLORAMAR únicamente como su médico le ha indicado. No se espera que una sobredosis accidental cause problemas graves. No obstante, si toma más DESLORAMAR del que le han indicado, comuníquese a su médico inmediatamente o concurra al hospital más cercano o comunicarse con los centros de toxicología:

- Hospital de Pediatría Ricardo Gutiérrez: (011) 4962-6666/2247.
- Hospital A. Posadas:(011) 4654-6648 // 4658-7777 // 0800-333-0160.
- Hospital Fernández: (011) 4808-2655 // 4801-7767

Si olvidó tomar DESLORAMAR:

Si olvidó tomar su dosis a su hora, tómela lo antes posible y después continúe con el esquema de dosificación habitual. No tome una dosis doble para compensar las dosis olvidadas.

Si interrumpe el tratamiento con DESLORAMAR:

Si tiene cualquier otra duda sobre el uso de este medicamento, pregunte a su médico.

4. POSIBLES EFECTOS ADVERSOS

Al igual que todos los medicamentos, DESLORAMAR puede producir efectos adversos, aunque no todas las personas los sufran. La fatiga, la sequedad de boca y el dolor de cabeza se comunicaron más frecuentemente. En adolescentes, el dolor de cabeza fue la reacción adversa comunicada más frecuentemente.

Durante la comercialización de Desloratadina, se han notificado muy raramente casos de reacciones alérgicas graves (dificultad al respirar, respiración con pitos, picor, ronchas cutáneas e hinchazón).

Durante la comercialización de Desloratadina, se notificaron los siguientes efectos adversos como:

Muy raros: los siguientes pueden afectar hasta 1 de cada 10.000 personas:

- reacciones alérgicas graves
- latidos cardíacos rápidos
- vómitos
- mareo
- dolor muscular
- agitación con aumento de movimiento corporal
- erupción cutánea
- dolor de estómago
- estómago revuelto
- somnolencia
- alucinaciones
- inflamación del hígado
- latidos cardíacos fuertes o irregulares
- ganas de vomitar (náuseas)
- diarrea
- dificultad para dormir
- convulsiones
- alteración en las pruebas de la función hepática

Comunicación de efectos adversos:

Si experimenta cualquier tipo de efecto adverso, consulte a su médico, incluso si se trata de posibles efectos adversos que no aparecen en este prospecto. Mediante la comunicación de efectos adversos usted puede contribuir a proporcionar más información sobre la seguridad de este medicamento.

5. CONSERVACIÓN DE DESLORAMAR

Mantener este medicamento fuera de la vista y del alcance de los niños.

No utilice este medicamento después de la fecha de vencimiento que aparece en el envase y blíster.

Mantener a temperatura entre 15 a 30 °C, en lugar seco y protegido de la luz.

No utilice este medicamento si observa algún cambio en el aspecto de los comprimidos.

6. PRESENTACIONES DE DESLORAMAR.

DESLORAMAR COMPRIMIDOS RECUBIERTOS 5 mg: Envases conteniendo 7 y 14 comprimidos recubiertos.

DESLORAMAR JARABE 50 mg/100 mg: Envases conteniendo 60 ml, acompañados de una medida dosificadora.

ESTE MEDICAMENTO ES LIBRE DE GLUTEN



Ante cualquier inconveniente con el producto el paciente puede llenar la ficha que está en la Página Web de la ANMAT o llamar a ANMAT responde 0800-333-1234.

<http://www.anmat.gov.ar/farmacovigilancia/Notificar.asp>

Comercializado y distribuido por:

LABORATORIOS MAR S.A.: Av. Gaona 3875. CABA. Tel: (5411) 4582-2929

Director técnico: Santiago H. Di Battista - Farmacéutico.

Comprimidos Recubiertos:

Elaboración hasta el granel y/o semielaborado: GALICIA 2652, CABA, REP. ARGENTINA. Le Corbusier 2881, Área de Promoción el Triangulo, Bs. As.

Acondicionamiento primario: AZCUÉNAGA 3944, BS. AS., REP. ARGENTINA.

Acondicionamiento secundario: GAONA 3875, CABA, REP. ARGENTINA.

Jarabe:

Elaboración hasta el granel y/o semielaborado: CORONEL MENDEZ 440, BS. AS., REP. ARGENTINA.

Acondicionamiento primario: CORONEL MENDEZ 440, BS. AS. REP. ARGENTINA.

Acondicionamiento secundario: GAONA 3875, CABA, REP. ARGENTINA.

Fecha de Actualización: 17/05/2022
DB11P-1621/D